

のどの殺菌・のどの痛み・はれに 健栄 Gトローチ

24個

健栄製薬

1 炎症を抑える + 2 殺菌 = ダブルの効き目

のどの殺菌
のどの痛み・はれに



健栄
Gトローチ

指定医薬部外品

24個

■成分・分量 1個中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg、グリチルリチン酸二カリウム 2.5mg、キョウエキス 20mg(原生薬換算量 80mg) ●添加物: 白糖、ゼラチン、ステアリン酸、ステアリン酸 Mg、パラベン、黄色5号、香料、L-メントール

■効能・効果 のどの殺菌・消毒、口臭の除去
のどの炎症による声がれ・のどのあれ・
のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ



ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。

健栄 Gトローチ 指定医薬部外品 24個

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)

用法・用量

成人(15歳以上) 1回1個を1日6回、5歳以上15歳未満 1回1個を1日3回、いずれも2時間以上の間隔をおいて口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。5歳未満は使用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】 (1)かみ砕いたり、飲み込んだりしないこと。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)トローチの取り出し方:下図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、表面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

開封口

製造番号

使用期限