

第3類医薬品

のどの痛み 口内炎


アズショットのドスプレー

開封日

〔使用方法〕




① 噴霧のフタをはずしてください。



② 「アー」と声をだしながら噴霧を押して、患部に薬液を2〜3回照射してください。

※最初は薬液が出るまで4〜5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、吸たれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対にやめください。

水性アズレン配合

のどの痛み 口内炎

アズショットのドスプレー



30mL

第3類医薬品

【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【容量】

90mL
【成分・分量】 (本剤1mL中) アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg 添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、ポリヒンクリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、β-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

【保存及び取り扱ひ上の注意】

【保存】直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)火気に近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼吸中に過氧希び運転と判定される濃度以上のアルコホル濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社

T634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL.0744-21-5588

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社

T634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用情報検索 ☎020-149-931

開封口

第3類医薬品

口腔内消炎剤

販売名：アズショット

ご使用に際して、この説明文書をお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

■ 相談すること

次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- ① 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- ② 口内炎にたれがひどい人。
- ③ 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

- (1) 症状が強化した場合。
- (2) 3.5〜6日間使用しても症状がよくなる見込みは使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】 1日数回量を患部に噴射塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 服を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息を吐きながら、2〜3回噴射してください。
- (3) 塗布のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

紙 箱 外装フィルム：PP



2019年2月改訂第2版



製造番号

使用期限