

開封特月日
年 月 日
開封時に記入してください


パールショットAZC

30mL 第3類医薬品




口腔咽喉薬 第3類医薬品

使用方法



※最初は薬液が出るまで4〜5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



のどの炎症による つらいのどの 痛み・口内炎に のどスプレー

抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

殺菌成分配合

セチルピリジニウム
塩化物水和物

パールショットAZC 30mL



第3類医薬品 パールショットAZC

のどの炎症によるのどの痛み・
効能・効果 のどののれ・のどのあれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)	
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 (CPC)	3mg
添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 <i>l</i> -メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。	

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(原用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後的一定時間は、呼吸器に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元:白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL.0744-21-5588

受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元:タイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

指作用殺菌剤 0120-149-931

紙箱 外装フィルム: PP

開封口

第3類
医薬品

販売名:パールショットAZC

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

※ **してはならないこと**

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】
長期連用しないでください。

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者と相談してください。
- 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 口内のただれがひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者と相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
口	刺激感

(1) 症状が悪化した場合。
3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者と相談してください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのど患部にむけて、軽く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
- 塗布のみに使用し、内服しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

2401A01



製造番号

使用期限