

**：2018年2月(用法・用量、用法・用量に関する注意改訂)

*：2017年7月(使用上の注意、用法・用量に関する注意改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

生薬エキス・ジヒドロコデインリン酸塩配合 **特納用**

第2類医薬品

プレコール®せき止め錠

鎮咳去痰薬

プレコールせき止め錠の特徴

1. 鎮咳作用を有するジヒドロコデインリン酸塩を配合していますので、せき中枢にはたらいてせきをしずめます。
2. 気管支拡張作用を有するdl-メチルエフェドリン塩酸塩を配合していますので、気管支筋にはたらいて収縮やけいれんをしずめ、気管支を上げてせきをやわらげ、たんを出しやすくします。
3. 去痰作用を有するグアイフェネシン、カンゾウ粗エキス、セネガエキスを配合していますので、気道粘膜についているたんを出しやすくします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
4. 過量服用・長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
高熱
* (6) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

せき、たん

用 法・用 量

**

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回 (毎食後)
12歳以上15歳未満	3錠	
12歳未満	服用しないで下さい。	

**〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成 分・分 量

本剤は、白色の糖衣錠で、12錠中に次の成分を含有しています。

ジヒドロコデインリン酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60mg
グアイフェネシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 264mg
カンゾウ粗エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180mg
(カンゾウとして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900mg)
セネガエキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180mg
(セネガとして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 594mg)

添加物：乳糖、セルロース、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、白糖、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、アラビアゴム、ゼラチン、酸化チタン、カルナウバロウ、ミツロウ、パラフィン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標

販売元
 第一三共ヘルスケア株式会社
Daichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3