

〈使用法〉

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。

〈成分・分量〉 100mL中

ベンゼトニウム塩化物……………0.1g
アラントイン……………0.2g
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.2g
添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、*l*-メントール
アルコールを含むので、しみることもある。

〈保管及び取扱上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は、12カ月以内に使用して下さい。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入して下さい。
- (6) 持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れることがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

☎ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

特納用

キズの殺菌消毒に

マキロン[®]S

皮膚の修復成分配合

第3類医薬品

〈効能・効果〉

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

殺菌消毒薬
外用専用/40mL

第一三共ヘルスケア

〔容器の開け方〕



キャップがきつい場合には、ちょうつがいを親指で押して下さい。開けやすくなります。

〔容器の使い方〕

スプレー式

□を上にしてボディを瞬間的に強く押すと薬が霧状に出ます。すり傷、かき傷に。



洗浄式

□を下にしてボディを軽く押すと、そのまま薬液が流れます。汚れた傷口の消毒に。



脱脂綿に浸して

洗浄式の要領で、脱脂綿又はガーゼに浸して用います。目の上の傷や痔疾時の肛門の消毒等に。



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

®登録商標

MADE IN JAPAN