

指定医薬部外品

www.regain.jp

販売名:リゲインS1

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024

使用に際しては説明書きをよく読むこと。

■1本(50mL)中の成分■ ベンフォチアミン(ピオタミン:ピタ  
ミンB<sub>6</sub>誘導体)10mg、ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル 5mg、ビタミン  
B<sub>6</sub> 10mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、  
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール)30mg、タウ

リン 1000mg、  
トウキエキス  
45mg(当帰  
150mgに相  
当)、オウセイ  
エキス 90.9  
mg(黄精300  
mgに相当)

●添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビトール、ブドウ糖、  
アセスルファムK、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、5'-イノシン  
酸2Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、グルコン酸Ca、アルコール、  
カラメル、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、エチル  
バニリン、ビタミンE、ミツロウ (アルコール0.39mL以下)

■効能・効果■ 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・  
栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、  
滋養強壮、虚弱体質 ガラス:瓶 金属:キャップ 02

使用期限

製造番号 ㊞登録商標

# リゲイン<sup>㊞</sup>

## 肉体疲労時の栄養補給に

# Regain<sup>㊞</sup>

50mL



Daiichi-Sankyo

ピンは割れものですので、  
お取り扱いにご注意下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 田村薬品工業株式会社

販売元 奈良県御所市西寺田50

■用法・用量■ 成人(15歳以上)1日1回  
1本(50mL)を服用する。(用法・用量に

関連する注意)用法・用量を守  
ること(他のビタミン等を含有す  
る製品を同時に使用する場合は  
過剰摂取等に注意す  
ること)。

**使用上の注意** 相談すること 次の場合は、直ちに  
服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に  
相談すること。1.服用後、皮ふに発疹、消化器に胃部  
不快感、下痢の症状があらわれた場合  
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合

■保管及び取扱い上の注意■ 1.直射日光の当たらない  
涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない  
所に保管すること。3.生薬エキスを配合しています  
ので、ときに沈殿を生じることがありますが、効果に  
は変わりありません。よく振って服用して下さい。

