

〔特納用〕

指定医薬部外品 12錠

# 新ルルエース トローチ



## のどの痛み・はれ 口内の殺菌・消毒

### 殺菌成分と炎症を抑える成分の

セチルピリジニウム塩化物水和物

キョウエキス

## ダブル処方



第一三共ヘルスケア

Daichi-Sankyo



使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないで下さい。

本剤又は牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人(添加物に脱脂粉乳を使用)

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔成分・分量〕 6錠中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………6mg

キョウエキス……………150mg(原生薬として600mg)

添加物:白糖、脱脂粉乳、還元麦芽糖水アム、ゼラチン、

マクロゴール、ポビドン、黄色5号、香料、ステアリン酸Ca

#### 〔用法・用量〕

次の量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして下さい。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1錠	6回 2時間以上の 間隔をおいて下さい。
5歳以上15歳未満		
5歳未満	使用しないで下さい。	

〔用法・用量に関連する注意〕(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)5歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。

(3)本剤はトローチですので、かみくだいたり、そのまま飲み込んだりしないで下さい。

(4)錠剤の取り出し方:図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用して下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



#### 〔効能・効果〕

○のどの炎症による次の症状:のどの痛み・のどのはれ

のどのあれ・声がれ・のどの不快感

○口腔内の殺菌・消毒 ○口臭の除去

開封口

製造 第一三共ヘルスケア株式会社

販売元 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先 お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

新ルルエーストローチ 指定医薬部外品 □腔咽喉薬

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



01®登録商標 4 987107 617811

