

第2類医薬品

# ゼノール<sup>®</sup>エクサム<sup>®</sup> SX

## 広くグリッとぬれる 太めりチック

Z E N O L Z E N O L Z E N O L

# ゼノール<sup>®</sup> エクサム<sup>®</sup> SX

ハードゲル

## 肩・腰の 痛み



外用鎮痛消炎薬

フェルピナク  
3.0%  
配合

グリッとぬれる  
太めりチック

販売名：ゼノールエクサム SX

第2類医薬品

ご使用に際して、このパッケージに記載の  
説明書きをよくお読みください。また、必要な  
ときに読めるように大切に保管してください。

### 効能・効果

関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）

### 用法・用量

1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおわらないでください。(5)患部の汗をふきとってから使用してください。(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。(7)薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

### 成分（100g中）

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	3.0g

添加物として、イソプロパノール、プロピレングリコール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸Na、1,3-ブチレンジオール、オレイルアルコール、スクワラン、pH調整剤を含有します。

### 内容量

43g

販売元 大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.03-3293-4509  
http://www.taiho.co.jp/

製造元 三笠製薬株式会社  
東京都練馬区豊玉北2-3-1

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

開封口

## つらい肩・腰の痛みに グリッと広くぬれる太めりチック

太めりチックだから、肩から首すじまで  
広範囲にしっかりぬれます。



痛みとその周辺患部に  
グリッと押しつけるように  
ぬってください。

下をまわすと（薬剤）が出てきます。  
4～5mm出して使用してください。

フェルピナク3.0%配合

## こんな時に使いやすい太めりチック



腰の痛みと周辺患部に  
しっかりぬれます。



腕や足の筋肉の痛みに  
広くぬれます。

引火性固体 イソプロパノール

登録商標

紙箱 袋：PE、PET、金属

11F405

AB  
1 2 3 4

製造番号

使用期限



4 987117 372014

### 使用上の注意

**してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。)(5)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(6)塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化粧、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。