

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

(10枚×2袋)

第2類医薬品

リフェンダFBテープα 20枚入

特長

- 有効成分フェルピナクを5.0%配合しています。
- フェルピナクが痛みの原因(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節などの痛みにも効果的です。
- α -メントールを3.0%配合していますので、すっきり爽快な使用感です。
- 可動部にもびったりフィットする、たて・よこ伸縮自在のテープ剤です。
- 溶剤を使用しないホットメルト製法で製造していますので、皮膚刺激の心配が少ないテープ剤です。
- においがひかえめ(微香性)で気になりません。
- ライナーに3分割フィルムを採用していますので、貼りやすいです。
- チャック付の薬袋で、未使用分の保存に便利です。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘等)、打撲、捻挫

【用法・用量】

- ・表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
- ・15歳未満の小児は使用しないでください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g中(1枚7cm×10cm、膏体量0.7g)

フェルピナク……5.0g α -メントール……3.0g
添加物：BHT、タルク、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、テルペン樹脂、流動パラフィン

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、チャックをしっかりとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 株式会社タカミツ
〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。
株式会社 タカミツ 電話 0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間(月~金曜日 9:00~17:00 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



開け方

