



**1日1回**  
**24時間効果**

セルフメディケーション

税 控除 対象

**スコルバ® EX**

ワンツウ 噴射式  
使いすぎ防止機能付

速く乾く

深く浸透

水虫・たむし用薬

殺真菌成分ブテナフィン塩酸塩  
+ かゆみ止め成分 + 殺菌・消毒成分

50mL

第2類医薬品

製造販売元 田村薬品工業株式会社  
奈良県御所市西寺田50

販売名: **スコルバ® EX**

【効 能】 みずむし、いんきんたむし、  
ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に噴射  
塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) **目には入れないこと。**万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けること (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4)外用にのみ使用する  
こと (5)患部まで3cm以内の距離で噴射すること (6)凍傷等の恐れがあるので、同じ箇所  
に連続して1秒以上噴射しないこと (7)吸入  
しないこと (8)用法・用量を厳守すること

【成 分】 ブテナフィン塩酸塩…100mg  
クロタミトン…300mg  
50mL中 グリチルレチン酸…50mg  
1-メントール…200mg  
ベンザルコニウム塩化物…5mg

添加物: ジソプロパノールアミン、ミリスチン酸イソプロピルプロピレングリコール、  
ラウリン酸マクロゴール、エタノール、LPG  
〈成分に関連する注意〉  
塗布時にしみることもある

⚠【使用上の注意】

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状  
が悪化したり、副作用が  
起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと  
本剤又は本剤の成分により過敏症状(発  
疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたこと  
がある人  
2.次の部位には使用しないこと  
(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、  
口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等  
(2)湿疹 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷  
のひどい患部

**相談  
すること**

1.次の人は使用前に医  
師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦ま  
たは妊娠していると思われる人 (3)乳幼  
児 (4)薬などによりアレルギー症状を起  
こしたことがある人 (5)患部が広範囲の  
人 (6)いんきんたむし等で内股に塗布す  
る人 (7)患部が化膿している人 (8)「湿  
疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにた  
むし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆ  
み・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等  
他の原因による場合が多い)

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作  
用の可能性があるので、直ちに使用を中止  
し、この容器を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談すること  
皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、  
刺激感、熱感、落屑、ただれ、水泡、乾燥感、  
ヒリヒリ感、亀裂  
3.2週間位使用しても症状がよくなる場合  
は使用を中止し、この容器を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管する  
こと (2)小児の手の届かない所に保管すること  
(3)火気に近づけないこと (4)使用済みの容器  
は火中に投じないこと (5)捨てるときには、火  
気のない屋外で噴射音がしなくなるまでノズル  
を下に向けてたまくり返し押し、ガスを抜く  
こと (6)本剤のついた手で、目や粘膜に触れな  
いこと (7)使用期限を過ぎた製品は使用しない  
こと (8)本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化し  
たり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や  
家具等につかないようにすること

【治療に際しての注意】

(1)患部は常に清潔にすること (2)汗をかいたあとや  
入浴後は、患部を十分に乾かすこと (3)みずむしは、  
症状がなくなったあとも、1か月  
間は根気よく治療を続けること

**火気と高温に注意**


高压ガスを使用した可燃性の製品であり、  
危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用  
している室内で大量に使用しないこと。③高温にする  
と破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やス  
トーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上  
となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。  
⑤使い切って捨てること。 高压ガス:LPガス

第一石油類 (10mL) 危険等級II (エタノール) A01  
お客様相談室 06-6203-5151 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 電話 0120-149-931

**必ずノズルを下に向けて使用すること**

ボタンを素早く最後  
まで押してください。  
ひと押しごとに薬液が  
噴射されて止まります。  
弱くゆっくり押しすと噴  
射が止まらず、使用可  
能回数が減ります。



プラスチック: キャップ (PP)、  
ボタン: (PE, POM)、フィルム: (PP)、  
缶: 金属

製造番号・使用期限は缶底に記載 Ⓜ

