

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## フェルピナク配合 鎮痛消炎パップ剤 コリアフターFBパップ

8枚入 [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量10g]

### 【特長】

- フェルピナクを1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎パップ剤です。
- 医療用にも使われている成分のフェルピナクが、痛みの元となる物質の生成を抑え、肩・腰・関節などのつらい痛みにも優れた効果を発揮します。
- 伸縮性のよい基布で関節にもピッタリフィットします。

### ▲ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1)目の周囲、粘膜等
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口
  - (3)みずむしたむしなど又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 【用法・用量】

年齢	使用方法
15歳以上	表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

### 【用法・用量に関する注意】

- (1)定められた用法・用量をお守り下さい。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

### 【成分・分量】(膏体100g中)

成分	含量	はたらき
フェルピナク	0.7g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、マクロゴール、ポリソルベート80、β-メントール、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈ご相談窓口〉

お問い合わせのお店又は下記窓口まで  
東和製薬株式会社 ☎(0736)64-2567  
時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸九番1229番地

使用期限

製造番号



4 987450 002067

