

**【特長】**

インドメタシンを1.0%配合した、局所吸収薬です。インドメタシンが痛みの元に素早く浸透し、つらい痛みにも効果的です。曲がっているボトルが、首の塗りにくかった患部へ上手に塗布できます。

**【効能・効果】**

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手、手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

**【用法・用量】**

1日4回を限度として患部に適量塗布する。

[用法・用量に関連する注意事項]

- (1) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、症状の重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (2) 11歳未満の小児に使用させないこと。
- (3) 11歳以上小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させること
- (4) 外用のみに使用し内服しないこと。
- (5) 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと。
- (6) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと。
- (7) 皮膚の特に弱い方は、同じところに続けて塗布しないこと。
- (8) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること。

**【成分・分量】(100mL中)**

インドメタシン ..... 1000mg  
 l-メントール ..... 3000mg  
 添加物：エデト酸ナトリウム水和物、マクロゴール、ベンジルアルコール、ヒプロメロース、エタノール 含有

販売名:コリアフタID液

第2類医薬品 内容量 80mL

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性 アルコール類含有物

**⚠ 使用上の注意**

⊗ (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
  - (1) 目の周囲、粘膜など
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
  - (3) みずむし、たむしなど、又は化膿している患部
3. 長期運用しないこと

**■ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度  
 電話0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象



**インドメタシン1%  
ローション**

つらい 肩の痛み 腰痛 関節痛 など ス 筋肉痛

**痛み**に と浸透

- ベタつかない
- 患部に浸透
- のびが良い

コリアフタID液 第2類医薬品

80mL Pi プロダクト・インバージョン

容器を立てて保管してください。

使用前にこの文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手のとどかないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)。
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 金属類、化粧品の衣類、プラスチック類、メガネ、床や家具などの塗表面等に液が付着すると変質させることがあるので、付着しないように注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (8) 本剤が衣類や寝具などに付着し汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと



発売元  
 株式会社プロダクト・インバージョン  
 富山県富山市浜黒崎239番地  
 製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栴1229番地

お客様相談窓口

お買い求めのお店又は下記窓口まで

東和製薬株式会社

☎ (0736) 64-2567

時間 9:00~17:30

(土・日・祝日を除く)