

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

アンテドラッグステロイド配合

かゆい「部位」に効く かゆくてつらい皮膚炎・湿疹・かぶれに <鎮痒消炎薬> メソッドプレミアム AS軟膏

第②類医薬品

〈こんな症状に・こんな方に〉



8種の有効成分が効く



かゆみを
すばやく止める
*ジフェンヒドラミン塩酸塩
*クロダミトン
*リドカイン

炎症を鎮め、赤みや
ツツツツを抑える
*ブレドニゾロン吉草酸エステル
*グリチルレチン酸

荒れた肌を
修復する
*アラントイン

患部を殺菌する
*イノプロピル
メチルフェノール

血行を促進し、
患部の修復を助ける
*トコフェロール
酢酸エステル

アンテドラッグステロイド
(ブレドニゾロン吉草酸エステル
基準内最大量配合*)

アンテドラッグステロイドとは……
皮膚表面の患部では優れた効果を発揮し、体内では分解されて穏やかな物質になる、有効性と安全性を考えて開発されたステロイドです。

*一般用鎮痒消炎薬製造販売承認基準の最大量配合。承認基準とは、厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと。

●患部に密着して守る、しみない軟膏 ●無香料、無着色、防腐剤(パラベンなど)無配合 ●子供にも使えます

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連続して使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(必ず裏面もお読みください)

- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 濡潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|-----------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かゆみ、皮膚炎、湿疹、かぶれ、あせも、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分(1g中)

| 有効成分 | 含 量 | は たら き |
|------------------------------------|-------|---------------------|
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル<アンテドラッグステロイド> | 1.5mg | 炎症を鎮め、赤みやブツブツを抑えます。 |
| グリチルレチン酸 | 5mg | |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 20mg | |
| クロタミトン | 50mg | かゆみをすばやく止めます。 |
| リドカイン | 20mg | |
| アラントイン | 2mg | 荒れた肌を修復します。 |
| イソプロピルメチルフェノール | 1mg | 患部を殺菌します。 |
| トコフェロール酢酸エステル | 10mg | 血行を促進し、患部の修復を助けます。 |

添加物：マクロゴール、クエン酸水和物

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 使用後は必ずしっかりとキャップを閉めてください。

■お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

製造販売元 万協製薬株式会社

〒519-2174 三重県多気郡多気町五桂1169-142 0320