

**[効能・効果]**  
みずむし、いんきんたむ  
し、ぜにたむし  
**[用法・用量]**  
1日1回、適量を患部に  
塗布してください  
<用法・用量に開連する  
注意>

(1) 定められた用法・用  
量をお守りください。  
(2) 患部やその周囲が  
汚れたまま使用しない  
でください。(3) 小児に  
使用させる場合には、  
保護者の指導監督のも  
とに使用させてください。  
(4) 目に入らないよ  
う注意してください。万  
一、目に入った場合には、  
すぐに水またはぬるま  
湯で洗い、直ちに眼科  
医の診療を受けてくだ  
さい。(5) 外用にのみ使  
用してください。(6) 本  
剤のついた手で目や粘  
膜にふれないでください。

RAKOO

30g

# 7つの有効成分配合 水虫治療

クリーム

# 殺真菌 (テルビナフィン塩酸塩)

## 1回で効く

抗炎症  
成分

3種の  
かゆみ  
止め成分

冷感  
成分

殺菌  
成分

ナードム  
水虫プラスHT7クリーム

第2類医薬品

水虫・たむし  
治療薬

**[成分・分量]** 1g中

テルビナフィン塩酸塩…  
10mg リドカイン…  
20mg ジフェンヒドラミ  
ン塩酸塩…5mg グリチ  
ルレチン酸…5mg イソ  
プロピルメチルフェノ  
ール…3mg クロタミトン  
…50mg L-メントール  
…20mg

添加物：ステアリン酸グ  
リセリン、ステアリン酸  
ポリオキシル、ジメチルポ  
リソリキサン、プロピレ  
ングリコール、1,3-ブチレ  
ングリコール、エデト酸  
Na水和物、pH調節剤、  
その他4成分

**[保管及び取扱い上の注意]**

(1) 直射日光の当たらない  
涼しい所で保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に  
保管してください。(3) 他の容器に  
入れ替えないでください  
(誤用の原因になったり  
品質が変わることがあります)。  
(4) 使用期限(外  
箱及び容器に記載)を過ぎ  
た製品は使用しないで  
ください。また、使用期  
限内であっても、開封後  
はなるべく速やかに使用  
してください。

ここから  
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

### 【使用上の注意】

してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起  
こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(例  
えば発疹・発赤・かゆみ・はれ等)を起こしたこ  
とがある人

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目や目の周囲、粘膜(例  
えば口腔、鼻腔、眼  
等)、陰のう、外陰部等。  
(2) 遺尿。(3) 過敏。ただ  
れ、電撃や外傷のひどい部位。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者  
に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または  
妊娠している可能性のある人。(3) 乳幼児。(4)  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがあ  
る人。(5) 患部が創面または広範囲の人。(6)  
湿疹が化膿している人。(7) 遺尿(かみすむし、  
いんきんたむし、ぜにたむし)かはりきしな  
い人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある  
場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の  
可能性があるので、直ちに使用を中止し、この  
説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売  
者に相談してください

関係部位	症 状
皮 脊	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(ケ やアカのように皮が剥がれる)、だ だ乾燥、つっぱり感、皮のふくらみ、痛み、 色素沈着、発疹・発赤・かゆみ・はれ、 じんましん

\*:全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合  
や、本剤の使用により症状が悪化した場合は  
使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬  
剤師または登録販売者に相談してください

発売元  
ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鍾洋町丁目1番14号  
◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 010-20-86-8998

製造販売元  
東光薬品工業株式会社  
東京都足立区鍾洋町12丁目16番23号