

ビタミン含有保健剤

キューピーコーワヒーリング錠

キューピーコーワヒーリング錠は、3種の生薬・5種のビタミン・アミノ酸などから構成されるビタミン剤で、疲労回復・栄養不良に伴う身体不調を改善します。また、カフェインを配合していないため、おやすみ前にも服用ができ、“休息したい体”に適した処方となっています。

製品特長

- 滋養強壮作用のあるエゾウコギ・オキソアミジンに加え、鎮静作用のあるチョウジのトリプル生薬を配合し、「毎日の疲れ」・「翌朝に残ってしまいがちな疲れ」にすぐれた効果を発揮します。
- カフェインを配合していないため、おやすみ前にも服用できます。
- 食前・食後に関わらず、1日1回、1回2錠で効果を発揮します。

このような方に

- 寝ても取れない疲れがある方に。
- 栄養不良に伴い、目覚めが悪い・眠りが浅い・寝付きが悪い方に。
- カフェインを含まないビタミン剤をお求めの方に。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- ③ しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
◇目覚めが悪い、眠りが浅い、寝付きが悪い
◇疲れが残る、疲れやすい、体力がない、身体が重い、身体がだるい
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠 ○○	1回
15歳未満の小児	✕ 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量 (2錠中)

成分・分量	働 き
エゾウコギ乾燥エキス 14.0mg (エゾウコギとして 350mg)	エゾウコギの根及び根茎から抽出された成分で、疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
オキソアミチン末 50.0mg	ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
チョウジ末 20.0mg	チョウジのつぼみを粉末とした成分で、鎮静作用があります。
カルニチン塩化物 50.0mg	エネルギー産生に関与します。
ガンマ-オリザノール 10.0mg	自律神経の調整に関与します。
チアミン硝化物 (V.B ₁) 10.0mg	5種のビタミンの補給により、疲労などへの効果をサポートします。
リボフラビン (V.B ₂) 4.0mg	
ニコチン酸アミド 12.0mg	
ピリドキシン塩酸塩 (V.B ₆) 5.0mg	
L-アスコルビン酸ナトリウム 112.6mg [L-アスコルビン酸 (V.C) として 100mg]	

[添加物] セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸 Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸 Ca、白糖、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、青色二号、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- ⑤ 容器の中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあげた後は、必ず捨ててください。
- ⑥ 容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ⑦ 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。
- ⑧ 外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあげた日付を記入してください。
- ⑨ 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあげた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

● 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14