

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

かぜ薬

特納用

## 第2類医薬品

かぜに……

## 新ルルエース

## 新ルルエースの特徴

かぜはいろいろな原因が重なり合って発病しますので、その症状も多種多様であり、かつ複雑です。

かぜのときには早めに適切な治療をすることが、治りを早める上から大切です。

新ルルエースは、鼻水・鼻づまり・熱・せき・痛み等かぜの諸症状の緩和に効果をあらわす有効成分を配合したかぜ薬です。



## 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気等があらわれることがあります)
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 授乳中の人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。




- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
□のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## ■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15 歳 以 上	3錠 	3回 食後なるべく30分以内に 服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2錠 	
5 歳 以 上 11 歳 未 満	1錠 	
5 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 5歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■ 成分・分量

本剤はうすい帯茶白色の糖衣錠で、9錠中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ）をおさえます。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
無水カフェイン	90mg	頭痛をやわらげます。
ペントキシベリンクエン酸塩	48mg	せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	210mg	たんを切れやすくします。

添加物：セルロース、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸、白糖、フマル酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ポビドン、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、カラメル、カルナウバロウ

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

11 ㊞ 登録商標



製造販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
東京都中央区日本橋3-14-10