



多言語対応で読み上げてくれるよ。スキャンしてね。
It supports display and voice reading in multiple languages.

製品特徴
Product features
QR Translator



この説明文書は服用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

鎮咳去痰薬（非麻薬性）

販売名：メジコンせき止め液Pro

メジコン®せき止め液Pro

第2類医薬品

SHIONOGI

メジコンせき止め液Proは、せき中枢に直接作用し、せきをしずめるデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、たんを出しやすくするクレゾールスルホン酸カリウムの2つの有効成分の作用により、つらいせき・たんの症状にすぐれた効果を発揮する非麻薬性のせき止め薬です。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
（眠気などがあらわれることがあります）

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(4) 次の症状のある人 高熱
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください 眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
5. 症状の改善が見られても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください



効能・効果

せき、たん



用法・用量

次の1回量を1日3回、おのみください。また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

- 定められた用法・用量を厳守してください。

年齢	1回量
成人(15才以上)	6mL
15才未満	服用させないこと

お子さまが簡単に開けられない安全キャップを採用しています。

安全キャップの使用方法

キャップを下に押しながら
反時計まわりに回して開ける



正しい服用の仕方

計量カップのフチに瓶の口をあてて、1回量(6mL)を注いでください。1回量を必ず守って、服用してください。



※瓶は平らなところに置いてください。



成分・分量

メジコンせき止め液Proは淡黄褐色澄明の粘稠な液体で、18mL(成人1日量)中に次の成分を含有しています。


成分	含量(18mL中)	はたらき
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	45mg	せきをしずめる
クレゾールスルホン酸カリウム	270mg	たんの切れをよくする

添加物として エタノール、白糖、カラメル、安息香酸、水酸化ナトリウム、安息香酸ベンジル、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、香料を含有しています。



保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 計量カップは、使用後水洗いなどして、清潔に保管してください。
- (5) キャップをしめる際は、びんの口をよく拭いてからしめてください。びんの口に薬液が付着したままキャップをしめると、まれに開けにくくなる場合があります。また、閉め方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。
- (6) キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50～60℃)につけると開けやすくなります。
- (7) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

●(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

®登録商標

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号

【メジコンせき止め液Proのご使用に際して】

×「せき・たん」をしずめる目的以外で使用しないでください。

メジコンせき止め液Proを有効かつ安全にご使用いただくために、用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。ご使用の際は、「使用上の注意」をよく読んで、用法・用量などを厳守して正しくご使用ください。

こちらにアクセスいただくと、
さまざまな相談窓口情報をご覧いただけます。



↑相談窓口情報

誤って過量服用された場合は直ちに医師の診察を受けてください。

せきがひどくなる前に。予防が大切です。

1

「うがい」をしましょう。



のどの粘膜には、空気中から取り込んだウイルスや菌が付着していることも。ウイルスや菌を体内に入れてしまわないよう、うがいをすることを習慣にしましょう。

2

「手洗い」をしましょう。



あらゆるものに触れる手には、ウイルスや菌が付着している可能性が。石鹸とお湯を使った手洗いを、こまめに行うことを心がけましょう。手をいつも清潔に保ちましょう。

3

定期的に水分を
摂りましょう。



のどはウイルスや菌などの異物を排出する役割を担っています。のどが乾燥すると、この機能が低下してしまいます。こまめに水分補給を行い、のどが潤った状態を保ちましょう。

「せきが出る…」そんな時は、せきエチケットを守りましょう。

1

マスクを着用する。
(口・鼻を覆う)



2

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う。



マスクが
ない時

3

袖で口・鼻を覆う。



とっさの時

メジコンせき止め液Proを服用後、乗物または機械類の運転操作を
しないでください (眠気などがあらわれることがあります)

シオノギヘルスケアは、セルフケア社会の実現に向けた情報提供を進めています。

製品特徴
Product features
QR Translator

